

EXEMPLE PRATIQUE

UN ÉQUILIBRE SYLVO-CYNÉGÉTIQUE TOUT EN NUANCES DANS LE JURA SOLEUROIS

Formation continue forêt-gibier 2026, Zollikofen
21 janvier 2026



Mélila Saucy

**Garde forestière et
cheffe d'entreprise
suppléante**

**Forstbetrieb Leberberg
(Soleure)**

Forstbetrieb Leberberg

1445 m. alt.

Surf. Forest. (ha)	2'800
Possibilité (m3/an)	14'500
Budget (Mio. CHF)	3,2

136 km
de routes
forestières

1 tracteur de débardage
1 tracteur monté forêt
4 véhicules d'équipes




2 garde forestiers
8 bûcherons
3 apprentis
1 secrétaire
(**1** stagiaire)

Selzach



422 m. alt.

Entrepreneurs: débardage, coupes à la récolteuse, déchiquetage, transport du bois, fendage du bois, réfection des chemins, fiduciaire



Grenze Forstrevier FBL

Waldreservate

Wald bewirtschaftet durch den Forstbetrieb Leberberg

Privatwald

0

1

2 km



FORÊT = MULTIFONCTIONNALITÉ







LES PRINCIPAUX PROTAGONISTES DU CÔTÉ «FAUNE»



SYLVICULTURE








**DIVERSITÉ DES
ESSENCES**

A photograph of a lush forest. In the foreground, there are various green plants and shrubs. The middle ground is filled with tall, slender evergreen trees, possibly spruce or fir, with dense foliage. The background shows more trees, some with lighter bark, suggesting a mix of species. The overall scene is vibrant and green, indicating a healthy forest environment.


DIVERSITÉ DES STRUCTURES

Jeunes perchis appréciés pour les frayures et
l'écorçage



Recensement du cerf élaphe à Neuchâtel – Travail de projet 2024 - Valère Bilat

- « La ronce dans une forêt jardinée est habituellement rasante au-dessus du sol et en lisière de forêt ..., elle n'apporte que relativement peu de nourriture et certainement pas de couvert à de si grands cervidés. »
- « ...le rajeunissement produit par ce mode de sylviculture crée une verticalité variée qui n'offre ni un bon couvert épais de repos, ni une forêt ouverte avec un bon dégagement visuel. »
- « ... les zones abritant des groupes de cerfs ... comprennent à la fois des zones de rajeunissement épais où les cerfs peuvent y rester discrets, tout en trouvant une bonne source de nourriture permanente telle que des ronces et des jeunes bois blancs pionniers, accolés à des patches de perchis haute tige et des zones de gagnage. »



A photograph of a lush, green forest. Tall, slender trees with light-colored bark stand prominently, surrounded by a dense canopy of vibrant green leaves. The forest floor is covered in thick undergrowth. In the bottom right corner, there is a semi-transparent dark brown rectangular box containing white text.

**OFFRE
ALIMENTAIRE
IMPORTANTE ET
BIEN RÉPARTIE**



**MAUVAISE VISIBILITÉ
POUR LA CHASSE**

SURFACES DE GAGNAGE



MESURES DE PROTECTION CONTRE L'ABROUTISSEMENT







Feldformular 1 Verjüngungsansprache 2025 - Beurteilung

MONITORING

Fläche Nr.: 3	Waldbauliche Zielsetzung trotz Wildeinfluss erreichbar bezüglich			MONITORING
	Schlüsselbaumarten		Weitere Baumarten	
Standort	verbiss-unempfindlich	verbiss-empfindlich		
1 Keine Beeinträchtigung	Ja	Ja	bis <1/4 der BA nicht erreichbar ok	Die waldbauliche Zielsetzung kann für alle BA erreicht werden.
2 Beeinträchtigung der Baumartenmischung	für alle BA mind. verzögert erreichbar	für <½ der BA nicht erreichbar	für ≥1/4 der BA nicht erreichbar	Die waldbauliche Zielsetzung kann bezüglich Stammzahl erreicht, bezüglich Mischung teilweise erreicht werden.
3 Starke Beeinträchtigung einer oder mehrerer Schlüsselbaumarten	für <½ der BA nicht erreichbar	für ≥½ der BA nicht erreichbar	< ½ nicht erreichbar	Die waldbauliche Zielsetzung kann bezüglich Stammzahl zumindest verzögert, bezüglich Mischung nicht erreicht werden.
4 Starke Beeinträchtigung der Schlüsselbaumarten	für ≥½ der BA nicht erreichbar	Für alle BA nicht erreichbar	> ½ nicht erreichbar	Die waldbauliche Zielsetzung kann weder bezüglich Stammzahl noch Mischung erreicht werden.

↓
Zeigt erste Hinweise -
Fazit wird nicht tiefer sein
als diese Stufe

↓
Ausschlaggebende
Beurteilung

↓
Relativierende Beurteilung wenn noch kein
Fazit durch Schlüsselbaumarten ermittelt
ODER ausschlaggebend, wenn zu wenig
Schlüsselbaumarten vorhanden sind.

Wald - Wild

Indikatorfläche Nr. 3

Riedholz / Rüttenen

Forstrevier Leberberg

Jagdrevier Nr. 8

Legende


Probefläche Nr.



Indikatorfläche



© Amt für Wald, Jagd und Fischerei
Bearbeiter: RR
Druckdatum: 2.3.2015
Massstab 1 : 5000



CHASSE

Übersichtskarte

Jagdreviere und Jagdbanngebiete

 Jagdrevier (inkl. Revier-Nr.)


 Jagdbanngebiet

 Gemeindegrenzen




0 4000 Meters


Chevreaux



Chamois



Sangliers



STATISTIQUES
CHASSE

Source: Amt für Jagt, Kanton Solothurn

LE LYNX







« UN ÉCOSYSTÈME EST
UNE SYMPHONIE DU
VIVANT DANS
LAQUELLE CHAQUE
ESPÈCE JOUE SA
PARTITION.

À L'HOMME DE DEVINER
LA SIENNE POUR
ÉLEVER LA MUSIQUE DU
MONDE SANS
DISSONANCE. »

BERNARD BOISSON, 2008



A close-up photograph of a tree trunk with a mossy branch and a blurred background of red and green lights.

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**

QUESTIONS ?